Lamisil® 1
Clorhidrato de terbinafina 1,12%
Solución

Antimicótico

Industria Suiza

Venta Libre

USO DEL MEDICAMENTO. LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

1. ¿Qué contiene Lamisil® 1?

Cada 100 gramos de Lamisil® 1 contiene 1.125 g de clorhidrato de terbinafina como ingrediente activo equivalentes a 1 g de terbinafina como base.

La solución formadora de película también contiene los siguientes componentes inactivos:

Copolímero de Acrilatos/Octilacrilamida, hidroxipropilcelulosa, triglicéridos de cadena mediana, alcohol etílico.

ACCION TERAPEUTICA

2. ¿Cómo actúa Lamisil® 1?

Lamisil® 1 actúa eliminando los hongos que pueden causar el pie de atleta. Cuando se aplica a los pies, deja una película incolora que se mantiene sobre la piel. La película libera la sustancia activa dentro de la piel para tratar el pie de atleta.

3. ¿Cómo puede saber si padece de alguna infección de la piel causada por hongos?

El pie de atleta aparece únicamente en los pies (usualmente en ambos). Éste a menudo da inicio entre los dedos, pero también puede diseminarse a las plantas y lados de los pies.

El tipo más común de pie de atleta causa fisuras o escamas de la piel. Usted también puede tener una inflamación leve, ampollas o llagas que supuran. Esto a menudo puede estar asociado con una sensación de picazón o ardor.

Si usted no está seguro de que sus síntomas realmente se deben al pie de atleta, hable con un médico o farmacéutico antes de utilizar Lamisil® 1.

INDICACIONES

4. ¿Para qué sirve Lamisil® 1?

Utilizado para tratar el pie de atleta (hongos en los pies). En una única aplicación por tratamiento.

DOSIS / MODO DE EMPLEO

5. Cómo usar este medicamento:

Para los adultos y adolescentes de 15 años de edad y mayores:

Aplique Lamisil® 1 únicamente <u>una vez</u>. No lo aplique una segunda vez.

Usted debe aplicar Lamisil® 1 en ambos pies (entre, por debajo y sobre los dedos, sobre las plantas y lados de los pies), incluso si los síntomas son visibles únicamente en un pie.

Cuando se aplica en los pies, el medicamento se seca rápidamente y forma una película incolora. El tubo tiene el medicamento suficiente para tratar ambos pies.

Lamisil® 1 libera el ingrediente activo dentro de la piel donde éste se mantiene por varios días para tratar los hongos que causan el pie de atleta. Con el fin de obtener los mejores resultados, no enjuague ni rocíe sus pies por 24 horas después de aplicarlo.

Cuándo utilizar Lamisil® 1:

Es mejor aplicar Lamisil® 1 después de una ducha o un baño.

¿Cómo utilizar?

- Este es un tratamiento de una sola aplicación.
- Lave ambos pies y séquelos cuidadosamente.
- Lave y seque sus manos.
- Retire la tapa del tubo.
- Aplique en ambos pies – use la mitad del tubo para cada pie, según sea necesario, hasta cubrir la piel. Finalice con un pie antes de tratar el otro.
- Aplique con los dedos en cada pie como se muestra a continuación. Disemine uniformemente sobre la piel entre, por debajo y sobre todos los dedos. Luego aplique sobre la planta y los lados de su pie.
- **No friccione ni aplique masaje.**





- Trate el otro pie de la misma forma, incluso aunque la piel parezca sana.
- Permita secar hasta formar una película durante uno a dos minutos, antes de usar su calzado normal.
- Vuelva a colocar la tapa en el tubo y elimine cualquier producto restante.
- **No guarde ni entregue el producto sobrante a otra persona.**
- Lave sus manos con agua tibia y jabón después de la aplicación.
- **No lave o rocíe sus pies por 24 horas después de aplicar Lamisil® 1.**
- **No lo aplique una segunda vez.**

Si los síntomas persisten por más de una semana o empeoran, consulte a su médico o farmacéutico.

No utilice el producto una segunda vez para un episodio particular de pie de atleta, si éste no funciona después de la primera aplicación.

Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis recomendada.

6. ¿Aparte del tratamiento, qué otras medidas deben tomarse?

Mantenga el área afectada limpia, lavándola regularmente después de las primeras 24 horas. Séquela cuidadosamente sin friccionarla. Aunque la piel podría picar, no trate de rascarla porque esto podría producir más daño y demorar el proceso de curación o diseminar la infección.

Utilice su propia toalla y ropa y no la comparta con otras personas debido a que el pie de atleta se transmite fácilmente. Lave su ropa y toallas frecuentemente para que usted mismo se proteja de una reinfección.

7. ¿Que sucede si accidentalmente ingiere Lamisil® 1?

Si ingiere accidentalmente Lamisil® 1, contacte a su médico inmediatamente.

8. ¿Qué sucede si usted accidentalmente se aplica el producto en la cara o en los ojos?

Lave su cara u ojos completamente con agua corriente. Vea a su médico si todavía siente alguna molestia.

CONTRAINDICACIONES

9. ¿Cuándo no debe usarse Lamisil® 1?

Si es **alérgico o hipersensible a cualquiera de los componentes de la fórmula** enumerados en la sección "¿Qué contiene Lamisil® 1?".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

10. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Lamisil® 1?

- **Niños menores de 15 años no deben usar Lamisil® 1.**
- **Si usted sufre de alguna enfermedad micótica de largo plazo en las plantas y en los talones de los pies** con una piel engrosada u obviamente escamosa **no use Lamisil® 1**. Cuéntele a su médico si cree que puede tener esta condición porque de ser así usted podría necesitar otro medicamento.
- **Si usted tiene una infección fúngica en las uñas**, con uñas descoloridas, gruesas y escamosas **no use Lamisil® 1**. Cuéntele a su médico si usted cree que puede tener alguna infección en las uñas, puesto que puede requerir de un medicamento de prescripción.
- **Use Lamisil® 1 únicamente para tratar la piel de sus pies.** Sea cuidadoso de no aplicarlo en su cara, ojos o piel dañada (aparte del área de tratamiento) donde pueda ser irritante.

- **Si accidentalmente se aplica en los ojos, enjuague completamente con agua corriente.** Vea a su médico si todavía siente alguna molestia.
- **No lo trague.**

Embarazo / Lactancia

11. ¿Puede ser utilizado Lamisil® 1 durante el embarazo o el período de lactancia?

Si está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Personas de edad avanzada

13. ¿Puede ser usado Lamisil® 1 en las personas de edad avanzada?

Lamisil® 1 puede ser utilizado en personas de edad avanzada. Además de las precauciones generales de uso, no es necesario tomar precauciones especiales en éstas personas.

REACCIONES SECUNDARIAS

14. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Lamisil® 1?

Lamisil® 1 puede causar alergia, sarpullido en la piel, picazón, ampollas de la piel o vesículas,

sequedad en la piel, irritación de la piel o sensación de ardor después de la aplicación.

Consulte a su médico o farmacéutico si cualquiera de los efectos adversos empeoran o si observa cualquier otra reacción que cree pueda ser provocada por Lamisil® 1.

INTERACCIONES

15. ¿Está tomando otros medicamentos?

No aplique otros medicamentos o tratamientos a sus pies (incluyendo cualquiera que haya comprado sin prescripción) al mismo tiempo que Lamisil® 1.

Cuéntele a su médico o farmacéutico si usted está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluyendo cualquiera que ha comprado sin prescripción.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
-Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez- T.E. (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.
-Hospital A. Posadas- T.E. (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

COMENTARIOS ESPECIALES

16. ¿Cómo se debe almacenar Lamisil® 1?

- Conservar a temperatura ambiente a no más de 30 ºC.
- No utilice el producto después de la fecha de expiración que se indica en el empaque.
- Almacene en el empaque original con el fin de protegerlo de la luz.
- Contiene alcohol. Mantener alejado de las llamas.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Presentación: Envase conteniendo 4 g

Fabricado por Novartis Consumer Health S.A., Nyon, Suiza.

Fecha de la última revisión: Julio 2006, basado en el SPC de Febrero del 2006.

Importado y distribuido por:
Novartis Argentina S.A.
Ramallo 1851 - C.P. C1429DUC - Buenos Aires - Argentina.
Director Técnico: Lucio Jeroncic – Químico, Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 40.985

Fecha de última revisión de prospecto: Mayo 2007

Línea de atención al consumidor: 0800-444-4024